

دیابت را بهتر بشناسیم

دیابت از جمله بیماری‌های متابولیک مزمن است که خردسالان و بالغین بسیاری را در کشورهای مختلف جهان مبتلا ساخته است. این بیماری که در واقع اختلال در متابولیسم گلوکز است، علاوه بر عوارض جسمی، پیامدهای نامناسب روانی و اجتماعی نیز دربردارد. درمان این بیماری سالها مدنظر محققین علوم زیست - پزشکی بوده است؛ اما آنچه که در حال حاضر، بیش از هرچیز حایز اهمیت است، چگونگی مراقبت از این بیماران و نحوه برخورد صحیح با بیماری است. در رابطه با دیابت کتابهای بسیاری نگاشته شده است و بحث تفصیلی آن در این مختصر نمی‌گنجد. مقاله حاضر به اختصار جنبه‌های گوناگون دیابت و برخی آزمایش‌های تشخیصی پیرامون سنجش مقدار قند را ارایه می‌دهد.

منابع: ۲۲ مورد

گردآوری و تنظیم:
خدیجه دهقانی
پریسا درخشان راد
انوشه سلاجقه
فیروزه فیروزآبادی
شمیلا اسلامبولچی

دیابت چیست؟

لغت دیابت از یک کلمه یونانی به معنی «سیفون» گرفته شده و در مورد نوعی بیماری به کار می‌رود که فرد مقدار زیادی ادرار دفع می‌کند. لغت ملیتوس نیز از کلمه لاتین "مل" به معنی شیرین بوده و مزه شیرین ادرار را توصیف می‌کند. دیابت شیرین^۱ D.M اختلالی است که در اثر کاهش ترشح انسولین از پانکراس در نتیجه کاهش توانایی بدن برای سوخت و ساز کربوهیدرات و همچنین اختلال در متابولیسم پروتئین و چربی پدید می‌آید. دیابت، شایع‌ترین اختلال آندوکراین - متابولیک در دوران کودکی و نوجوانی است که

تأثیر مهمی بر تکامل جسمی و عاطفی فرد می‌گذارد. آسیب‌پذیری و مرگ و میر ناشی از این بیماری زیاد بوده و منجر به بروز عوارض طولانی مدت نظیر: رتینوپاتی، نفروپاتی، کم‌خونی موضعی، انسداد شریانی و گانگرن، می‌گردد.

انواع دیابت و چند نوع اختلال تحمل کربوهیدرات را می‌توان به صورت زیر عنوان نمود:
۱- دیابت شیرین ایدئوپاتیکی:

- دیابت وابسته به انسولین^۱ (نوع I)
I.D.D.M
- دیابت غیروابسته به انسولین^۲ (نوع II)
N.I.D.D.M
- دیابت جوانان همزمان با بلوغ^۳
M.O.D.Y

۲- دیابت ثانویه: دیابت ثانویه در ارتباط با بیماری‌های دیگری مثل سندرم کوشینگ، آلدوسترونسم اولیه، فئوکروموستیوم یا مصرف داروها، مواد شیمیایی (مانند، دیورتیک‌ها، هورمون‌ها، استروئیدها، داروهای روان‌گردان، کاتکول‌آمین‌ها، داروهای ضد سرطان)، بعضی از سندرم‌های ژنتیکی (مانند: لیپودیستروفی‌ها، دیستروفی میوتونیک، آتاکسی تلانژکتازی فیروکسیتیک پانکراس) رخ می‌دهد. به علاوه، بیماری‌های پانکراس به‌ویژه پانکراتیت مزمن، حاملگی، استرس و سوختگی‌های شدید، انفارکتوس حاد میوکارد و سایر بیماری‌های مهلک، نیز می‌توانند منجر به دیابت شوند. دیابت دیگری نیز بنا به گزارش سازمان جهانی

بهداشت (۱۹۸۵) در نواحی وسیعی از استوا شناخته شده که به "M.R.D یا دیابت ناشی از سوء تغذیه ۵" معروف است. این نوع دیابت قبل از ۳۰ سالگی در مبتلایان به سوء تغذیه آغاز می شود و معمولاً همراه با کتواسیدوز نیست.

دیابت ثانویه در صورت درمان بیماری اولیه، قابل برگشت می باشد.

۳- اختلال در تحمل گلوکز: اصطلاح اختلال در تحمل گلوکز^۳ برای افرادی استفاده می شود که ۲ ساعت پس از صرف غذا، غلظت قند پلاسماشان از ۱۴۰ میلی گرم بیشتر می شود، اما علائم دیابت و یا هیپرگلیسمی ناشتا را ندارند.

سابقاً به جای این اصطلاح از عبارات های: دیابت بدون علامت، دیابت شیمیایی، دیابت تحت بالینی، دیابت فوری یا دیابت نهان استفاده می شد. حداکثر ۱۰ درصد از کسانی که دچار عدم تحمل گلوکز هستند، به دیابت مبتلا خواهند شد. اختلال تحمل گلوکز از طریق تست تحمل گلوکز خوراکی^۷ تشخیص داده می شود.

۴- دیابت آبستنی^۸ (G.D.M)

در حدود ۳-۲ درصد زنان باردار دچار دیابت می شوند و نمی توانند گلوکز را تحمل کنند. احتمال می رود که هورمون های لاکتوزن و انسولیناز جفتی (متضاد انسولین) از عوامل پدید آورنده دیابت باشند. حاملگی سبب آشکار شدن دیابت در افرادی می شود که دیابت پنهان دارند. هم چنین استروئیدها و قرص های ضد بارداری نیز ممکن است دیابت پنهان را آشکار نمایند. اگرچه ممکن است دیابت آبستنی در سه ماهه دوم بارداری ظاهر شوند اما، معمولاً زمان بروز آن سه ماهه سوم است.

۵- افراد مستعد به دیابت: به طور کلی، بیمارانی که سابقه فامیلی دیابت دارند، افراد چاق، مادرانی که نوزادانی با وزن بیش از ۴/۵ کیلوگرم بدنیا آورده اند و یا سابقه دیابت حاملگی دارند، افرادی که آترواسکلروز زودرس دارند، مبتلایان به عفونت های مکرر یا مزمن، افراد مبتلا به رتینوپاتی، نفروپاتی و یا دیگر تظاهرات عروقی، بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند.

از آنجایی که دیابت شیرین ایدئوپاتییک به علت اولیه بودن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از این پس به شرح انواع آن یعنی: "I.D.D.M"، "N.I.D.D.M" و "M.O.D.Y" می پردازیم.

دیابت وابسته به انسولین (دیابت نوع I) I.D.D.M

در حدود ۱۰-۵ درصد از دیابتی ها، به نوع I.D.D.M مبتلا می باشند. این افراد به علت عدم ترشح انسولین لوزالمعده و کمبود شدید انسولین در معرض خطر کتوز و مرگ قرار دارند و زندگی شان وابسته به تزریق انسولین است. شروع این بیماری معمولاً در کودکی است.

شیوع بیماری در مردان و زنان تقریباً مساوی است. بیشترین زمان بروز آن، در دو گروه سنی ۷-۵ سال و هنگام بلوغ می باشد. بروز بیماری در ۷-۵ سالگی به علت افزایش تماس با عفونت ها در شروع مدرسه و در دوران بلوغ نیز ناشی از بروز رشد ناگهانی و ترشح هورمون های استروئیدی گسادی (متضاد انسولین) و استرس های عاطفی این دوران می باشد.

در حدود ۲/۳ بیمارانی پس از تشخیص، وارد یک مرحله بهبودی نسبی یا کامل به نام «دوره ماه غسل»^۹ می شوند که از چند هفته تا چند ماه و گاهی تا ۲-۱ سال طول می کشد. در این مرحله سلول های پانکراس هنوز اندکی فعالیت دارند و به همین دلیل نیاز فرد به انسولین کم می شود. این نیاز تقریباً از یک واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ۰/۵ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می رسد.

علائم کلاسیک دیابت کودکان شامل: "پلی اوری، پلی دیسی، پلی فاژی و کاهش وزن" می باشد. این علائم به طور ناگهانی در عرض ۳-۱ هفته بروز می کند. گاهی، هنگام تشخیص این بیماری در دختران نوجوان عفونت چرکی پوست و واژینیت مونیلیایی نیز موجود است. علائم دیابت در نوزادان ممکن است با حملات سیانوتیک و آپنه همراه باشد. اگرچه این بیماری در سنین زیر ۲ سال

نادر است، حدود ۱/۳ بیمارانی در زمان تشخیص و بروز دیابت با کتواسیدوز دیابتی مراجعه می کنند.

این بیماری به کمک تغذیه، ورزش و انسولین مهار می گردد و احتیاج به کنترل متابولیک مداوم دارد. حفظ قند خون در محدوده طبیعی می تواند از بروز عوارضی چون رتینوپاتی، نوروپاتی، نفروپاتی و آثار قلبی - عروقی تا حد زیادی پیشگیری کند.



باید یادآوری شود، که دیابت دیگری بنام، دیابت گذران نوزادی^{۱۰} وجود دارد که علت آن نامعلوم است و در هفته های اول پس از تولد به طور نادر در نوزادان به خصوص نوزادان کم وزن پیش می آید.

علائم بیماری شامل هیپرگلیسمی (معمولاً بدون کتواسیدوز) همراه با گلوکز اوری - کم آبی و اسیدوز متابولیک است. تجویز انسولین همراه با سایر درمانهای معمول برای رفع کم آبی و اسیدوز لازم است. معمولاً پس از چند هفته تا چند ماه نیاز به انسولین مرتفع می گردد. این نوزادان در سنین بالاتر آمادگی بیشتری برای ابتلا به دیابت ندارند.

تشخیص:

وجود گلوکز اوری، کتونوری و هیپرگلیسمی همراه با علائم بالینی منجر به تشخیص دیابت می گردد. گلوکز اوری به تهایی وسیله تشخیص دیابت تبیت، زیرا ممکن است بعضی از اختلالات مادرزادی، سندرم فانکونی (Fonconi)، اختلالات توبولی کلیه به علت مسمومیت با فلزات سنگین مثل سرب، مسمومیت دارویی یا مصرف بعضی از داروها مثل تتراسایکلین تاریخ گذشته، عفونت، تروما، استرس فیزیکی و روحی، بعضی از بیماری های آندوکرینی نیز گلوکز اوری ایجاد نمایند. در این موارد عدم وجود هیپرگلیسمی تشخیص دیابت را رد می کند.

قند خون ناشتا بیش از ۱۴۰ میلی‌گرم و ۲ ساعت بعد از غذا بیش از ۲۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر تشخیص دیابت را ثابت می‌کند. در افراد بدون علامت، همراه با غلظت طبیعی گلوکز ناشتای خون، تست تحمل گلوکز خوراکی بعمل می‌آید.

دیابت غیر وابسته به انسولین^۳

(دیابت نوع II)

NIDDM

حدود ۹۵ - ۹۰ درصد افراد دیابتی به این نوع از دیابت مبتلا هستند. اختلال متابولیسم در این افراد ناشی از مقاومت در مقابل انسولین، ترشح ناکافی انسولین، کاهش گیرنده‌های انسولینی و یا تخریب انسولین در بدن می‌باشد. این بیماری معمولاً بعد از ۴۰ سالگی و اغلب در افراد چاق به وجود می‌آید. تظاهرات بالینی از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است و گاه آنقدر خفیف است که پس از سالها مشخص نمی‌شود.

در بسیاری از موارد، بیمار به علت عوارض بیماری مراجعه می‌کند: خستگی، میل به خواب بعد از صرف غذا، تحریک پذیری، شب‌ادراری، خارش پوست و دستگاه تناسلی، زخم‌های پوستی که دیر ترمیم می‌یابند، تاری دید و کرامپ عضلانی از علائم هشداردهنده دیابت نوع II می‌باشند. به دلایل نامشخص این بیماران مستعد کتواسیدوز نبوده و به سندرم کوما هیپراسمولار غیرکتوزی دچار می‌شوند. درمان و کنترل این بیماران شامل رعایت رژیم غذایی و ورزش می‌باشد و در صورت عدم موفقیت، استفاده از داروهای خوراکی و در موارد خاص مصرف انسولین است. سطح گلوکز خون این افراد در اغلب موارد طبیعی و هیپرگلیسمی فقط بعد از صرف غذا یا در آزمون تحمل گلوکز مشاهده می‌شود.

دیابت جوانان همزمان با بلوغ^۴

MODY

این بیماری اغلب در نوجوانان چاق روی می‌دهد و به صورت اتوزومال غالب منتقل می‌شود. تولید انسولین غیرطبیعی موجب کاهش فعالیت بیولوژیکی آن می‌شود. محدودیت غذایی، راه کنترل این بیماری است و احتیاجی به انسولین نیست.

روی کروموزوم ۶ قرار دارند، زیرا بین دیابت و بعضی از آنتی‌ژن‌های لئوسیت انسانی که روی این کروموزوم قرار دارند، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. چهار نوکوس A، B، C، D روی کروموزوم ۶ وجود دارد که در هر محل از ۸ تا ۳۰ آنتی‌ژن شماره‌گذاری می‌شود.

ناحیه D به چندین گروه کوچکتر مثل DR، DP، DW، DE تقسیم‌بندی می‌شود. چهار نوع HLA در رابطه با دیابت شامل B8 - HLA، DR3 - HLA، B15 - HLA، DR4 - HLA هستند. بیش از ۹۰ درصد بیماران از نظر DR3، DR4 یا هر دو مثبت می‌باشند. خواهر و برادرهایی که HLA مشابه دارند، ۲۰ برابر بیشتر در معرض دیابت هستند.

۲ - عوامل محیطی:

با توجه به اینکه ۱۰ درصد از بیماران دیابتی نوع I، HLA مربوط به دیابت را ندارند و یا بعضی از افراد با وجود داشتن HLA مربوطه، مبتلا نیستند و از طرفی میزان همزمانی دیابت نوع I حتی در دو قلوهای مشابه فقط ۵۰ درصد است، می‌توان گفت که عوامل ژنتیک به تنهایی عامل بیماری نیستند، بلکه استعداد ژنتیکی موجب می‌شود تا فرایندهای خودایمنی و یا عوامل محیطی زمینه را برای بروز دیابت فراهم کنند.

از جمله عوامل محیطی که در بروز دیابت نوع I مؤثر است، عفونت‌های ویروسی هستند. احتمال دارد ویروس‌ها در جریان عفونت از طریق تخریب مستقیم توده سلول‌های بتا، با ایجاد تغییرات تدریجی در سلول‌های بتا یا برانگیختن واکنش‌های ایمنی، مسبب بروز دیابت گردند.

احتمال دارد که عوامل دیگری هم چون چاقی، کاهش فعالیت، رژیم غذایی به همراه عوامل اقتصادی - اجتماعی، مانند شلوغی خانواده و عادت‌های غذایی، دوره تغذیه با شیر مادر و سطح آموزش خانواده نیز می‌تواند در بروز IDDM نقش داشته باشند. به طوری که کودکانی که دوره کوتاه‌تری با شیر مادر تغذیه شده‌اند و از شیر گاو استفاده

اتیولوژی دیابت

تاکنون علت واقعی دیابت شناخته نشده است، اما می‌توان عوامل متعددی را در بروز آن دخیل دانست:

۱ - عوامل ژنتیک

۲ - عوامل محیطی

۳ - عوامل ایمنی

۱ - عوامل ژنتیک:

دخالت این عامل در دیابت نوع I و II از چند جهت با هم تفاوت دارد. هرچند دیابت بیشتر تمایل فAMILIAL دارد، اما مکانیسم واقعی توارث آن مشخص نشده است. فرزندان والدین مبتلا به دیابت نوع II، صددرصد به همان نوع دیابت دچار می‌شوند. اما فقط ۶۰ - ۴۵ درصد فرزندان والدینی که به دیابت نوع I مبتلایند، به بیماری دچار می‌شوند. شانس ابتلا به دیابت نوع II در دو قلوهای یکسان ۱۰۰ درصد است.

ژن‌های زمینه‌ساز در ایجاد IDDM، احتمالاً بر

کرده‌اند بیشتر در معرض خطر ابتلای به دیابت قرار دارند که احتمالاً به دلیل آنتی‌بادی‌سازی بر علیه پروتئین شیر گاو و برانگیخته شدن فرآیندهای اتوایمیون است .
استرس غیرمترقه و تماس با بعضی توکسین‌ها نیز بروز دیابت مؤثر می‌باشند .

۳ - عوامل اتوایمیون :

مکانیسم‌های اتوایمیون و HLA در دیابت نوع II نقشی ندارند ، اما تصور می‌شود تعداد زیادی از مبتلایان دیابت نوع I ، به نوعی اختلال اتوایمیون مبتلایند . دیابت نوع I با همراهی سایر بیماری‌های اتوایمیون مثل تیروئیدیت هاشی موتو ، بیماری گراو ، آدیسون ، سلیاک و آرتریت روماتوئید جوانان دیده شده است . بروز عوامل اتوایمیون موجب تخریب پانکراس و در نتیجه کاهش ترشح انسولین می‌گردند . با توجه به توضیحات فوق ، می‌توان گفت که وراثت ژن‌های خاصی در ارتباط با سیستم HLA روی کروموزوم ۶ ، استعداد ابتلا به بیماری دیابت را بیشتر می‌کند ، به ویژه وقتی که بدن با عوامل محرکی مثل ویروس تحریک گردد .

مبتلایان به بیماری قند مشهود است .

دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ تلقی می‌شود . این بیماری در اواخر قرن بیستم اپیدمی زیاد داشته و نشانه‌ای از توقف در آن دیده نمی‌شود . بیماری‌های غیرواگیر مزمن ، موجب مرگ و میر و ناتوانی‌های زیادی در بسیاری از کشورهای مختلف می‌شوند . از جمله ، بیماری دیابت که برای بهداشت کلی جهان یک خطر در حال رشد است . بدین جهت سازمان جهانی بهداشت با توجه بیشتری به آن می‌نگرد و استراتژی آن عمدتاً بر اساس تقویت خدمات بهداشتی ، تحقیق و آموزش می‌باشد .

در سال‌های گذشته تصور می‌شد ، بیماری دیابت بیماریی است که بیشتر در جوامع صنعتی دیده می‌شود . اما اخیراً در دو گزارش جداگانه سازمان جهانی بهداشت ، افزایش بروز دیابت را در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار داده است . جمعیت افراد دیابتی دنیا در حال حاضر بیشتر از ۵۰ میلیون نفر است که نیمی از آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند (جانسون) .

اگرچه تحقیقات زیادی در دهه اخیر در مورد اپیدمیولوژی این بیماری انجام شده است ولی هنوز دانش موجود درباره اپیدمیولوژی بیماری دیابت در نواحی گسترده‌ای از جهان ناقص است .

آمار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در طی سالهای ۵ - ۱۳۶۴ مربوط به تعداد مراجعین دیابتی به درمانگاه و مراکز بهداشت و البته به این سازمان ، رقم ۳۳۱۷۳ مورد مراجعه را نشان می‌دهد . در ضمن تعداد مرگ ناشی از دیابت را در همان سال ۱/۳ مورد در شهرستانها گزارش کرده است (خانی اسفندآبادی) .

در سال ۱۳۶۰ ، شیوع دیابت در سنین ۱۷ - ۶ سالگی ۵ نفر بوده است و از بین ۱۵۰۰۰ نفر بیماران دیابتی تحت درمان ۶/۹ درصد آنها بین ۳۰ - ۱۷ سالگی قرار داشتند و بیش از ۶ درصد آنها در محدوده سنی ۱۷ - ۱ سالگی بوده‌اند . طبق این گزارش بروز دیابت در شهرهای مرکزی ایران بیش

از سایر نواحی می‌باشد (اسماعیل بیگی) .

رجیبی (۱۳۶۸) تعداد بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۶ ، ۱۵۰۳۳ نفر بیان می‌کند (ص ۲۳) . و در سال ۱۳۶۴ تعداد دانش‌آموزان دیابتی ، ۵۰۱ نفر و در سال ۱۳۶۵ ، ۳۲۵ نفر در کل کشور اعلام می‌دارد (مرکز آمار ایران ۱۳۶۷ ، ص ۱۴۵) .

بر اساس این اطلاعات ، لزوم برنامه‌هایی در جهت پیشرفت بهتر مراقبت از خود و ارائه آموزش مؤثر و توجه بیشتر به بیماران دیابتی مشخص می‌گردد . در همین راستا ، لازم است اقدامات وسیع و منظمی در جهت پیشگیری از ناتوانی‌ها و شیوع بیماری دیابت در سطوح مختلف انجام شود .

امید است مسئولان بهداشت و درمان کشورمان گام‌های مؤثری در جهت رفع مشکلات ناشی از این بیماری پرخرج و ناتوان‌کننده بردارند .

اهمیت آموزشی در

بیماری دیابت

مقدمه :

آموزش بیمار یکی از بزرگترین مسئولیت‌های پرستاری است . به‌ویژه آموزش بیماران دیابتی از اهمیت خاصی برخوردار است ، چون دیابت یک بیماری مزمن است که احتیاج به تدابیر روزانه و طولانی مدت دارد . به‌طوری‌که می‌توان گفت : بدون آموزش ، بیمار دیابتی نمی‌تواند به زندگی عادی بپردازد .



با توجه به تحول نقش پرستاران در دهه اخیر، و تغییر آن از نقش‌های سنتی به نقش‌های حرفه‌ای، مسئولیت ایشان در زمینه آموزش بیمار از اهمیت چشمگیری برخوردار شده است.

بنابراین، لازم است مدیران و مسئولان آموزش و خدمات درمانی، در تربیت نسل جدید پرستاری به این امر مهم توجه و مهارت دانشجویان پرستاری و پرستاران بالینی را در جهت فراگیری و بکارگیری آموزش بیماران در بالین، تقویت نمایند.

در دهه گذشته، بدلیل تقاضای زیاد بیماران، پیشرفت مراقبت از خود و معیارهای پیشگیری، آموزش به بیمار مورد تأکید فراوانی قرار گرفته است. پرستار، مسئول بررسی نیازهای آموزشی بیماران و خانواده آنها می‌باشد. چون هدف از پرستاری به حداکثر رساندن توانایی بیمار برای مراقبت از خود در هر نقطه از طیف سلامتی - بیماری است.

یکی از بزرگترین گروه‌هایی که به آموزش احتیاج دارند، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن هستند و باید در جهت پیشگیری از ناتوانی این گروه از بیماران، تلاش فراوان نمود.

افزایش سالیانه مخارج بستری شدن در بیمارستان و هزینه‌های ناشی از آن، موجب ازهم‌گسیختگی خانواده آنها می‌گردد. با این جهت برنامه آموزش باید به منظور حفظ سلامتی بیمار در جهت صرفه‌جویی از مخارج گزاف باشد.

به‌علاوه مشکلات روانی، اجتماعی و تزلزل شخصیت نیز، بیماران این گروه و خانواده آنها را تهدید می‌کند.

علیرغم پیشرفت‌های واضحی که در درمان دیابت در قرن اخیر صورت گرفته، کیفیت مراقبت دیابت به ویژه از کشورهای در حال توسعه پیشرفتی نکرده است، که اولین دلیل آن عدم شناخت از آموزش بیمار می‌باشد. در اوایل سال ۱۸۷۵ میلادی، بوخارت^۱ اظهار کرد « آموزش بیمار اساس درمان NIDDM^۲ می‌باشد.»

آموزش بیماری دیابت به دلایل متعدد انجام می‌شود که شامل موارد زیر است:

دیابت یک بیماری مزمن است و مراقبت و درمان آن به شرکت فعالانه بیمار و خانواده وی بستگی دارد و این حالت تنها در صورت برآورده شدن دو شرط اساسی امکان‌پذیر است:

۱- دادن اطلاعات به بیمار

۲- پذیرش بیماری:

آموزش موجب درک بیمار از ماهیت دیابت و در نتیجه انگیزش بیشتر برای پذیرش بیماری و سازگاری با آن می‌شود.

۳- آگاهی و شناخت کافی از بیماری باعث می‌شود بیمار همکاری و پیگیری بیشتری در امر درمان و مراقبت از خود داشته باشد و از اقدامات اشتباه پیشگیری شود.

۴- پیچیدگی دیابت با تظاهرات متابولیکی متغیر و عوارض حاد و مزمن همراه با پیامدهای ناتوان‌کننده و تدابیر روزانه و مکرر موجب استرس زیادی در بیماران و خانواده آنها می‌گردد. از طرفی، درمان بیماری ساده نیست و عوامل متعددی در کنترل سطح قند خون دخیل هستند. بنابراین، برای رسیدن به سطح قند خون نزدیک به طبیعی، که هدف اصلی درمان است، شرکت فعال بیمار و آموزش وی لازم است.

۵- درمان و عوارض مربوط به دیابت گران است. میزان بستری شدن این بیماران ۲/۵ برابر افراد دیگر است. تدابیر و کنترل بهتر دیابت از طریق آموزش، موجب تأخیر در پیشرفت عوارض و کاهش هزینه‌های اقتصادی می‌گردد.

به‌طور کلی می‌توان گفت: آموزش در دیابت نوع انبلی به اهداف درمانی، شامل دستیابی به تغذیه مناسب، انسولین درمانی، پیشگیری از عوارض، تأمین رشد و تکامل طبیعی و زندگی فعال می‌شود و در دیابت نوع II، موجب کنترل بیماری بدون دخالت هیچگونه اقدامات درمانی دیگر می‌گردد.



اهداف طرح مراقبت

پرستاری در دیابت و سلامت

منظور از تهیه طرح مراقبت پرستاری بر روی بیماران مبتلا به دیابت شیرین، دستیابی به سه هدف عمده است:

- بی‌حسی و احساس سرما
- ۲- ۵- بُری و سوزش معده و ترش کردن
- ۳- ۵- تهوع و استفراغ
- ۶- اختلال در حواس پنج‌گانه: بینایی
- ۷- آسیب سلامت پوستی:
- ۱- ۷- شکنندگی پوست یا حساسیت آن
- ۲- ۷- تغییرات بافتی پوست بصورت زخم
- ۳- ۷- تأخیر در التیام زخم
- ۸- تغییر در الگوهای دفع ادراری
- ۱- ۸- احتباس ادرار
- ۲- ۸- بی‌اختیاری ادرار
- ۹- یبوست
- ۱۰- اسهال
- ۱۱- بی‌اختیاری دفع مدفوع
- ۱۲- استعداد ابتلا به عفونت
- ۱۳- حساس در برابر ضرب‌دیدگی
- ۱۴- عوارض حاد متابولسمی (شانویه) و غیرمتابولسمی:
- ۱- ۱۴- کتواسیدوز دیابتی
- ۲- ۱۴- هیپوگلیسمی (شوک انسولینی)
- ۳- ۱۴- HHNK یا اغمای هیپرگلیسمیک، هیپراسمولار غیرکتونی

- بتواند علائم و نشانه‌هایی را که باید به پزشک یا پرستار اطلاع دهد، بیان نماید.
- احساس‌ها و نگرانی‌های خود را دربارهٔ دیابت و اثری که بر زندگی وی نهاده است، بیان کند.
- منابع و مراکز اجتماعی که می‌توانند در تنظیم و کنترل دیابت به وی یاری نمایند را بشناسد.
- اهمیت پیگیری مراقبت‌ها را درک نموده، در طرح‌ریزی یک برنامهٔ مناسب با پرستار و پزشک همکاری نماید.

□ تشخیص‌های پرستاری:

- ۱- اضطراب
- ۲- اختلال در خورنسانی بافتی
- ۳- اختلال در تعادل مایعات و الکترولیت‌ها
- ۱- ۳- کمبود حجم مایع، کمبود سدیم، کلر، فسفات، منیزیم
- ۲- ۳- کمبود پتاسیم (هیپوکالمی)
- ۳- ۳- اسیدوز متابولیک
- ۴- اختلال در تغذیه: نیاز غذایی بدن تأمین نمی‌شود.
- ۵- اختلال در آسایش:
- ۱- ۵- درد، گزگز، سوزش، انقباض عضلانی،

- ۱- نگهداری سطح قند خون بیمار
 - ۲- پیشگیری از عود مجدد بیماری و عوارض آن
 - ۳- آموزش مددجو در زمینه لزوم پیگیری مراقبت‌های پس از ترخیص
- این اهداف با در نظر گرفتن تشخیص‌های پرستاری و قرارداد مبنای عمل بر بهبود کامل هر مشکل یا رسیدن به حداکثر امکان بهبودی دنبال می‌شوند.

□ معیارهای ترخیص مددجو:

پیش از آنکه بیمار (مددجو) مبتلا به دیابت شیرین از بیمارستان ترخیص شود، باید به یک سری آگاهی‌ها و توانایی‌ها به شرح زیر دست یافته باشد.

مددجو باید:

- درک پایه‌ایی از پاتوفیزیولوژی دیابت ملتئوس داشته باشد.
- درک صحیحی از نحوه دارودرمانی داشته باشد که شامل چند مورد است:

۱- دلیل تجویز هر یک از داروها

۲- عوارض داروها

۳- برنامه مصرفی آنها

۴- اهمیت مصرف داروها، مطابق تجویز آنها

- بتواند (در صورت تجویز) انسولین را به‌درستی در سرنگ کشیده، تزریق نماید.
- از اهمیت تنظیم رژیم غذایی آگاه بوده، بتواند در محدودهٔ مجاز دریافت کالری، برای خود یک برنامهٔ غذایی تهیه نماید.
- بتواند آزمایش‌های قند خون و ادرار را به‌درستی انجام داده، آنها را به نحو صحیحی تفسیر نماید.
- از نقش ورزش در کنترل دیابت مطلع باشد.
- بتواند مراقبت‌ها و فعالیت‌های بهداشتی که باید با زندگی وی عجین شوند را تعیین نماید.
- بتواند علائم و نشانه‌های هیپوگلیسمی و کتواسیدوز و راه‌های مناسب پیشگیری و درمان آنها را بیان نماید.



۴-۱۴ - ترومبوآمبولی

۱۵ - اختلال جنسی

a - ضعف و ناتوانی جنسی

b - کاهش میل جنسی

۱۶ - اختلال در استنباط ذهنی از خود

۱۷ - اشکال در سازش با محیط و مشکلات

۱۸ - اندوه

۱۹ - عدم قبول بیماری

۲۰ - کمبود آگاهی درباره نحوه مراقبت از خود

آزمایش تحمل گلوکز

عادی گلوکز خالص نمی‌خورد. بنابراین، نتیجه حاصل از خوردن گلوکز ممکن است نشانگر نتیجه طبیعی مصرف کربوهیدرات در غذا نباشد. آزمایش تحمل گلوکز را به چند روش انجام می‌دهند. یکی از روش‌ها این است که بیمار باید چند روز رژیم پرکربوهیدرات مصرف نماید و بعد (پس از پایان دوره مصرف) به فاصله هر ۲ ساعت از وی خون می‌گیرند و سطح قند خون را اندازه‌گیری می‌کنند.

آمادگی بیمار:

لازم است بیمار چندین روز قبل از انجام آزمایش تحمل گلوکز رژیم غذایی داشته باشد. آزمایش معمولاً در صبح زود انجام می‌شود و بیمار شب پیش از آزمایش نباید چیزی به جز آب بخورد. بنابراین، می‌توان نمونه ادرار را در زمان مناسب جمع‌آوری نمود. در آغاز آزمایش، برای اندازه‌گیری قند ناشتا و گسلوکز ادرار از بیمار نمونه‌های خون و ادرار می‌گیریم. بعد به بیمار ۱۰۰ گرم گلوکز محلول در آب می‌دهیم.

آزمایش تحمل گلوکز

پس از مصرف گلوکز، به فواصل یک، دو و سه ساعت از بیمار نمونه خون و ادرار گرفته می‌شود. گاهی ممکن است نمونه‌گیری به فواصل نیم ساعت هم انجام شود و گاهی آزمایش را تا ۵ ساعت هم ادامه دهند. به‌منظور آن‌که همه نمونه‌های خون و ادرار در ساعت معین تهیه شوند، لازم است پرستار و بیمار ساعت دقیق هر نمونه‌گیری را بدانند. اگرچه ممکن است بیمار در طی آزمایش چیزی نخورد، ولی باید مقدار زیادی آب بنوشد تا بتوان تمام نمونه‌های ادرار را تهیه کرد. البته اگر بیمار نتواند سر هر ساعت ادرار نماید، به گرفتن نمونه خون (برای آن ساعت) اکتفا می‌کنیم. زیرا آزمایش خون مهمترین بخش آزمون تحمل گلوکز است. همه نتایج حاصل از نمونه‌ها روی یک نمودار رسم می‌شوند تا مدت زمان لازم برای بازگشت قند خون به حد طبیعی مشخص شود. احتمال دارد قند خون افراد دیابتی دیرتر از حد معمول به حد طبیعی بازگردد، یا هرگز به سطح قند ناشتا نرسد. منحنی باید به دقت توسط پزشک تفسیر شود. در مورد محدوده طبیعی و غیرطبیعی قند خون (با این تست) اختلاف نظر بسیار است.



آزمایشهای خون در

دیابت

آزمایش تحمل گلوکز (GTT)

هدف از آزمایش:

آزمایش تحمل گلوکز به طریق خوراکی پیش از این، بهترین راه تشخیص دیابت تلقی می‌شد. اما، از آنجاکه عوامل زیادی می‌توانند بر صحت آزمایش تأثیر بگذارند، امروزه، اندازه‌گیری سطح قند خون ناشتا یا پس از صرف غذا (یا هر دو با هم) رایج‌تر است. بستری بودن، عفونت، ضربه، هم‌چنین برخی از داروها مثل دیورتیک‌ها، قرص‌های ضدبارداری و کورتیزول، همگی باعث اختلال در تست تحمل گلوکز می‌شوند. حتی استرس می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. بنابراین، هنگامی که بیمار در بیمارستان بستری است، تست تحمل گلوکز اغلب بی‌فایده است، زیرا فرد همیشه تحت یک سری استرس قرار دارد که نتیجه تست را مشکوک می‌سازد. ایراد دیگری بر آزمایش تحمل گلوکز وارد است و آن عبارت است از اینکه هیچ‌کس به‌طور



مقادیر اسیداستواستیک به علاوه استون $0/3$ تا 2 میلی‌گرم در 100 سی‌سی

مقادیر کتون سرم:


نمونه رقیق نشده - $(+4)$ به عنوان کتواسیدوز خفیف در نظر گرفته می‌شود.

نمونه رقیق شده به نسبت $1:1$ - $(+4)$ به عنوان کتواسیدوز متوسط در نظر گرفته می‌شود.

نمونه رقیق شده به نسبت $1:2$ - $(+4)$ به عنوان کتواسیدوز شدید در نظر گرفته می‌شود.


کتون سرم یا سطح کتون‌ها :

وقتی که گلوکز در دسترس سلول‌ها نیست و بدن، چربی و پروتئین را به عنوان منبع انرژی مصرف می‌کند، اجسام کتون (اسید استواستیک، استن و اسید بتا هیدروکسی بوتیریک) به عنوان فرآورده فرعی ایجاد می‌شود. حالت اسیدی این اجسام کتونی، کتواسیدوز را ایجاد می‌کند که ناشی از دیابت شیرین کنترل نشده یا گرسنگی شدید است. وقتی مشکوک به کتواسیدوز هستیم، آزمایشگاه می‌تواند به سرعت نمونه خون را برای تعیین نسبت مقدار کتون در خون آزمایش کند. به طور طبیعی سطح اجسام کتونی باید منفی باشد.



آمادگی بیمار و جمع‌آوری نمونه :

به طور معمول برای چنین آزمایش‌هایی ۲ میلی‌لیتر خون لازم است و پیش از خون‌گیری هیچ‌گونه آمادگی خاصی برای بیمار لازم نیست. نوارهایی که برای آزمایش کتون‌های ادرار مصرف می‌شود را می‌توان برای آزمایش کتون‌های سرم و خون نیز مصرف کرد. برای آزمایش سرم، رنگ نوار را دو دقیقه بعد از ریختن سرم روی آن مقایسه می‌کنیم. اگر خون کامل را روی نوار قرار دهیم، لخته خون بعد از ۱۰ دقیقه برداشته می‌شود، نوار با جدول شاهد مقایسه می‌شود.



تست مثبت کتون‌ها در سرم :

اهمیت کلینیکی :

کتواسیدوز بر اساس وجود مقادیر زیادی از کتون‌ها در سرم تشخیص داده می‌شود. از آنجائی که کتون‌ها توسط کلیه‌ها دفع می‌شوند، وجود یا عدم وجود آنها در خون، در اغلب مواقع از طریق آزمایش مداوم ادرار بررسی می‌شود. علت این امر دفع زیادی کتون خون توسط کلیه‌هاست. به همین

