

شیوع هیپوترمی نوزادان

پروین پالیزیان* (کارشناس پرستاری) - فسیرین کاظمیان (کارشناس پرستاری) - فرید زائری (کارشناس ارشد آمار)

فصلنامه حیات

سال دهم شماره ۲۲ پاییز ۱۳۸۳ صص ۱۲-۵

تاریخ دریافت مقاله: دی ماه ۱۳۸۲

تاریخ پذیرش مقاله: خرداد ماه ۱۳۸۳

چکیده

مقدمه: نوزادان تازه تولد یافته در معرض خطر هیپوترمی (درجه حرارت مرکزی کمتر از $36/5^{\circ}\text{C}$) را تهدید می‌کند. سانتی‌گراد) قرار دارند و تا چندین هفته بعد از تولد این خطر آنان را تهدید می‌کند.

مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی - تجربی است. درجه حرارت بدن نوزاد تازه متولد شده که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان پذیرفته می‌شدند در بد و ورود توسط دماسنجد Low Reading از طریق رکنوم اندازه‌گیری شد. درجه حرارت مرکزی بدن کمتر از $36/5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد به عنوان هیپوترمی در نظر گرفته شد و درجه حرارت $35-36/5^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی‌گراد به عنوان هیپوترمی خفیف و درجه حرارت کمتر از 35°C هیپوترمی متوسط تا شدید تلقی شد.

یافته‌ها: شیوع کلی هیپوترمی $53/3\%$ بود. از 456 نوزاد که دچار هیپوترمی خفیف بودند 34 نوزاد ($7/6\%$) از 22 نوزاد که دچار هیپوترمی متوسط تا شدید بودند 8 نوزاد ($42/1\%$) و از 420 نوزاد بدون هیپوترمی 11 نوزاد ($2/7\%$) فوت نمودند.

نتیجه‌گیری: شیوع و شدت هیپوترمی از نظر آماری به طور معناداری با وزن تولد و سن حاملگی در ارتباط بود. بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و انجام اقدامات به موقع از هیپوترم شدن نوزادان می‌توان پیشگیری کرد.

واژه‌های کلیدی: هیپوترمی، نوزادان، میزان مرگ و میر

* نویسنده مسؤول مقاله: تهران

- بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان ولی‌عصر (عج)

تلفن و نمایر: ۶۹۳۳۶۰۰

E-mail: parvin_palyzyan@yahoo.com

اطلاعات در مورد هیپوترمی نوزادان

بسیار محدود و پراکنده است اما بعضی از مطالعات نشان می‌دهد که هیپوترمی سبب افزایش مرگ و میر نوزادان می‌شود. در کشورهای پیشرفته آگاهی از این مسئله باعث بهبود چشمگیر مراقبت‌های نوزادان شده است و هیپوترمی نوزادان فقط در نوزادان بسیار نارس و یا در حال انتقال از مرکزی به مرکز دیگر مشاهده می‌شود.

هزن^۷ و همکاران شیوع کلی هیپوترمی (درجه حرارت زیر بغلی کمتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد) در میان نوزادان بسیار کم وزن^۸ (VLBW) متولد شده در آن مرکز را ۱۱/۵ درصد و انتقال یافته به آن مرکز را ۱۲/۵ درصد گزارش نمودند (۴). در مطالعه دیگری که توسط لاهد^۹ و همکاران در آمریکا بر ۱۹۹ نوزاد VLBW که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان پذیرش شده بودند انجام گرفت، شیوع هیپوترمی (درجه حرارت کمتر از ۳۶/۳ درجه هیپوترمی) ۴۵ درصد بود (۲). همچنین تاکایاما^{۱۰} و همکاران در مطالعه‌ای در ایالات متحده شیوع هیپوترمی را (درجه حرارت کمتر از ۳۶/۵ درجه سانتی‌گراد زیر بغل) در بین نوزادان سالم و رسیده ۱۷ درصد گزارش کردند (۵). در پژوهش دیگر در یک مرکز در استرالیا شیوع هیپوترمی در بین نوزادان ۱۱ درصد و در بین نوزادان خیلی کم وزن^{۱۱} ۳۶ درصد گزارش شده است (۶).

مقدمه

از اوایل سال‌های ۱۹۰۰ ثابت شد نوزادان تازه متولد یافته را خطر هیپوترمی (درجه حرارت مرکزی کمتر از ۳۶/۵ درجه سانتی‌گراد) تهدید می‌کند. در بدو تولد درجه حرارت بدن نوزادان کمی بیشتر و یا برابر دمای بدن مادر است اما در مدت چند دقیقه بعد از تولد درجه حرارت مرکزی بدن نوزاد به ویژه نوزادان کموزن شروع به افت می‌کند. در سال ۱۹۵۸ سیلورمن^{۱۲} ثابت کرد که حفظ دمای بدن میزان مرگ و میر را در نوزادان کم وزن کاهش می‌دهد. هیپوترمی به سبب از دست دادن حرارت بدن در نتیجه‌ی فرآیندهای تبخیر^{۱۳}، مجاورت یا انتقال^{۱۴}، تماسی یا هدایت^{۱۵} و یا تابشی^{۱۶} ایجاد می‌گردد. هوای سرد اتاق زایمان از طریق انتقال یا مجاورت، موجب کاهش دمای پوست نوزاد می‌شود. تبخیر آب از بدن خیس نوزاد نیز به این کاهش کمک کرده به طوری که در هر دقیقه بین ۱/۲-۲/۰ درجه سانتی‌گراد از دمای بدن نوزاد کاسته می‌شود (۲).

دلیل اصلی افت دما قادر نبودن بدن نوزاد به تولید گرمای کافی است. به علاوه نوزادان دارای سطح بدن وسیع نسبت به وزن خود هستند و در عین حال چربی زیر جلدی کمتری (به عنوان عایق) دارند (۳). نوزادان نارس یا بیمار نمی‌توانند به اندازه کافی چربی قهوه‌ای را بسوزانند و از این طریق تولید حرارت کنند.

1 - Hypothermia

2 - Silverman

3 - Evaporation

4 - Convection

5 - Conduction

6 - Radiation

7 - Hazan

8 - Very Low Birth Weight

9 - Loughead

10 - Takayama

11 - Extremely Low Birth Weight

مواد و روش کار

تمام نوزادان متولد شده و پذیرفته شده در بخش نوزادان شامل (سطح مراقبتی ۳-۲-۱) در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۸۰ به مدت یکسال در این طرح وارد گردیدند. درجه حرارت محیط اتاق زایمان و اتاق نوزادان به هنگام زایمان و در زمان پذیرش نوزاد در بخش در طول سال به وسیله یک ترمومتر دیواری ثبت گردید. درجه حرارت بدن هر نوزاد نیز در بدو پذیرش توسط پرستاران آموزش دیده اندازه‌گیری شد. درجه حرارت از طریق رکتال و با استفاده از Om (Low Reading) یک دماسنجد ساخت ژاپن (Rom mc-38) (Rom) اندازه‌گیری گردید. درجه حرارت کمتر از ۳۶/۵ درجه سانتی‌گراد هیپوترمی تلقی شد. شدت هیپوترمی بین شرح طبقه‌بندی گردید. دمای بدن بین ۳۵-۳۶/۵ درجه سانتی‌گراد به عنوان هیپوترمی خفیف و درجه حرارت کمتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد به عنوان هیپوترمی متوسط تا شدید طبقه‌بندی شد. سپس نوزادان بر اساس وزن زمان تولد و سن حاملگی گروه‌بندی شدند و اطلاعات مربوط به هر نوزاد در پرسشنامه در نظر گرفته شده ثبت می‌گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و تست‌های آماری مجاز کای^۲ تحلیل گردید و $p < 0.05$ ملاک معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در طی مطالعه ۸۹۸ نوزاد مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۱۸ نفر (۲درصد) آنها به دلیل عدم ثبت وضعیت حیات حذف گردیدند. نتایج نشان داد که شیوع کلی هیپوترمی ۵۳/۳ درصد

نداشت اطلاعات کافی کارکنان گروه پژوهشکی در مورد مدیریت هیپوترمی و پیشگیری از عوارض ناشی از آن یکی از دغدغه‌های مهم گروه مراقبتی و درمانی است. در نتیجه مراقبت‌های مربوط به کنترل و حفظ حرارت نقش کمتری در مراقبت‌های روتین آنها دارد. آمار گزارش شده از زامبیا نشان می‌دهد که ۴۴درصد از ۲۶۱ نوزاد ۵-۷ روزه که در یک بیمارستان اطفال پذیرفته شده‌اند درجه حرارت کمتر از ۳۶ درجه سانتی‌گراد داشته‌اند و مرگ و میر نیز در نوزادان هیپوترم بالا بوده است (۷). در مطالعه‌ای که در یکی از بیمارستان‌های نپال در سال ۱۹۹۲ صورت گرفت ۸۵ درصد از ۵۰۰ نوزاد متولد شده دمای بدن کمتر از ۳۶ درجه سانتی‌گراد در دو ساعت بعد از تولد داشتند (۸).

کمار^۱ و همکاران از هند گزارش دادند که از ۱۸۹ نوزاد متولد شده در منزل که در ۲۴ ساعت اول تولد درجه حرارت آنها توسط پرستار بهداشت جامعه اندازه‌گیری شده بود ۱۱۱ درصد هیپوترم بودند (درجه حرارت زیر بغلی کمتر از ۳۵/۶ درجه سانتی‌گراد). این رقم در فصل زمستان ۱۹/۱ درصد و در تابستان ۱/۳ درصد بود (۹) (جدول شماره ۹).

این تحقیق در مورد شیوع و شدت هیپوترمی و تعداد فوت‌شدگان بعد از تولد در مدت یکسال در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد تا با مقایسه سایر کشورها در جهت بهبود کیفیت کنترل و حفظ دمای بدن نوزاد در هنگام مراقبت‌های پرستاری اقدامات لازم انجام گیرد.

شدند. بررسی مرگ و میر با ۸۸۰ نوزاد صورت گرفته است. یعنی از ۴۷۸ نوزاد هیپوترم وضعیت حیات ۱۲ نوزاد و از ۴۲۰ نوزاد غیر هیپوترم وضعیت حیات ۵ نوزاد نامشخص بود. از ۴۵۶ نوزاد هیپوترم که درجه حرارت کمتر از $36/5$ درجه سانتی گراد در بد و ورود داشتند ۲ نوزاد (درصد) و از ۴۱۵ نوزاد غیر هیپوترم که در بد و ورود درجه حرارت مساوی و یا بالاتر از $36/5$ درجه سانتی گراد داشتند ۱۱ نوزاد ($2/7$ درصد) فوت نمودند که مجموعاً ۵۳ نوزاد (۶ درصد) از کل مورد مطالعه فوت نمودند. با توجه به آمار فوق نسبت خطر مرگ در نوزادان با درجه حرارت کمتر از $36/5$ درجه سانتی گراد $2/646$ برابر بیشتر از نوزادان با درجه حرارت مساوی یا بیشتر از $36/5$ درجه سانتی گراد بود (جدول شماره ۵) و نسبت خطر مرگ در نوزادان با هیپوترمی متوسط و شدید (>35 درجه سانتی گراد) $26/7$ برابر بیشتر از نوزادان با رسیده^۱ و نسبت خطر مرگ در نوزادان با هیپوترمی خفیف ($35-36/4$ درجه سانتی گراد) نسبت به نوزادان رسیده (درجه حرارت $36/5$ درجه سانتی گراد و یا بیشتر از آن) $2/03$ برابر بیشتر بود (جدول شماره ۶).

بود (۴۷۸ نوزاد) و ۴ نوزاد هیپوترم نبودند (جدول شماره ۲). میانگین زمان پذیرش نوزادان از زمان تولد در اتاق زایمان تا ورود به بخش نوزادان حدود ۲۰ دقیقه بود که بین نوزادان هیپوترم و غیرهیپوترم تفاوت آماری معناداری از این نظر وجود نداشت ($p>0/05$). نوزادان خیلی کم وزن در زمان تولد (کمتر از ۱۰۰۰ گرم) پایین‌ترین درجه حرارت یعنی $35/58$ درجه سانتی گراد را داشتند (جدول شماره ۲).

از نظر سن حاملگی شیوع هیپوترمی در نوزادان کمتر از ۲۹ هفتۀ $85/2$ درصد و در نوزادان بالای ۳۸ هفتۀ $45/4$ درصد بود (جدول شماره ۳). متوسط درجه حرارت نوزادان بالای ۳۸ هفتۀ در بد و ورود $36/25$ درجه سانتی گراد بود. از ۸۹۸ نوزاد مورد مطالعه 456 نوزاد ($50/8$ درصد) هیپوترمی خفیف و 22 نوزاد ($2/2$ درصد) هیپوترمی متوسط تا شدید داشتند. نتایج نشان داد که شدت هیپوترمی مشابه شیوع آن بین نوزادان کم وزن و با سن حاملگی کمتر بیشتر است (جدول شماره ۲). مدت زمانی که لازم بود نوزادان هیپوترم گرم شوند نیز با وزن آنها رابطه معنادار آماری داشت ($p=0/000$). همچنین مطالعه نشان داد که از ۷۸ نوزاد هیپوترم 118 نوزاد ($24/68$ درصد) یک ساعت بعد از پذیرش و گرم کردن همچنان هیپوترم بودند و گرم کردن یک نوزاد به طور متوسط حدود ۵ ساعت طول می‌کشید تا نوزاد از هیپوترمی رها گردد (جدول شماره ۴).

در بررسی مرگ و میر نوزادان مورد مطالعه حدود ۲ درصد از آمار کل مورد مطالعه به علت عدم ثبت وضعیت حیات آنها به علل مختلف (انتقال، ترخیص با رضایت و اشتباه بودن آدرس والدین جهت کسب اطلاع از وضعیت حیات نوزاد) از این محاسبه حذف

جدول شماره ۱ - مقایسه هیپوترمی در کشورهای مختلف سال ۱۳۸۰

کشورهای توسعه یافته				کشورهای در حال توسعه			
Canada ۴	USA ۳	USA ۵	Australia ۶	Nepal ۸	Zambia ۷	India	مطالعه
۱۹۹۱	۲۰۰۰	۱۹۹۷	۱۹۹۷	۱۹۹۳	۱۹۹۵	۱۹۹۸	سال
Hazan J, et al.	Loughead, MK, et al.	Takayama JI, et al.	Bowman ED, et al.	Johnson RB, et al.	Christensson K, et al.	Kumar R, et al.	نویسنده
درجه حرارت زیربغلی $<35^{\circ}\text{C}$	درجه حرارت زیر بغلی $<36/3^{\circ}\text{C}$	درجه حرارت بدن $<36/2^{\circ}\text{C}$	زیربغلی درجه حرارت $<36^{\circ}\text{C}$	درجه حرارت بدن $<36^{\circ}\text{C}$	درجه حرارت زیر بدن $<36^{\circ}\text{C}$	درجه حرارت زیر بغل $<35/6^{\circ}\text{C}$	تعریف هیوتورمی
VLBW ۵۵۹ * زایمان داخلی بیمارستان ** زایمان در بیمارستان دیگر	VLBW ۱۹۹ زایمان	۲۰۳ فول ترم زایمان داخلی	* کلیه نوزادان ** نوزادان ELBW حین انتقال	۵۰۰ زایمان در بیمارستان دیگر پس از ۲ ساعت اول تولد روزگی ۰-۷ روز	۳۶۱ زایمان در بیمارستان دیگر در ۲۴ ساعت اول تولد	۱۸۹ نوزاد ترم متولد شده در منزل در ساعت اول تولد	تعداد و خصوصیات افراد مورد مطالعه
*٪/۱۱/۵ **٪/۱۲/۵	+	%۴۵++	%۱۷+++	*٪/۱۷ **٪/۳۶	%۸۵++++	%۴۴	شیوع هیوتورمی
با همان خصوصیات و درجه حرارت تعریف شده در این مطالعه							
٪/۹/۸				"			مقایسه این
٪٪/۷۱/۸				"			مطالعه با دیگر
٪٪٪/۴۵/۳				"			مطالعات
٪٪٪٪/۳۵/۳				"			

* زایمان داخل بیمارستان

** انتقال از بیمارستان دیگر

کانارا + اد

کانادا +

جدول شماره ۲- میزان شیوع و شدت هیپوترمی بر اساس وزن به درصد نوزادان بسته شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) سال ۱۳۸۰

p	جمع کل		>۲۵۰۰		۱۵۰۰-۲۴۹۹		۱۰۰۰-۱۴۹۹		<۱۰۰۰		وزن (گرم) فرآوانی
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۰/۰۰۰	۴۵۶	۵۰/۸	۲۷۰	۴۵	۱۲۰	۵۸/۷	۴۷	۷۲/۳	۱۸	۶۹/۲	هیپوترمی خفیف
۰/۰۰۰	۲۲	۲/۰	۲	۰/۳	۱۲۱	۵/۳	۵	۷/۷	۴	۱۵/۴	هیپوترمی شدید
۰/۰۰۰	۴۷۸	۵۳/۳	۲۷۲	۴۰/۳	۱۳۲	۶۴/۱	۵۲	۸۰	۲۲	۸۴/۶	جمع شیوع هیپوترمی
۰/۰۰۰	۴۲۰	۴۶/۷	۳۲۹	۵۴/۷	۷۴	۳۵/۹	۱۳	۲۰	۴	۱۵/۴	درجہ حرارت طبیعی
۰/۰۰۰	۸۹۸	۱۰۰	۶۰۱	۱۰۰	۲۰۶	۱۰۰	۶۵	۱۰۰	۲۶	۱۰۰	جمع کل

جدول شماره ۳ - میزان شیوع و شدت هیپوترمی بر اساس سن حاملگی به درصد نوزادان بسته شده در بخش
مراقبت‌های ویژه بیمارستان و لیکنسر (عج) سال ۱۴۸۰

p	جمع کل		>۳۷		۳۴-۳۷		۳۰-۳۳		<۲۹		سن حاملگی (هفتہ) فراوانی
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۰/۰۰۰	۴۵۶	۵۰/۸	۲۲۱	۴۴/۸	۱۲۷	۵۲	۷۰	۶۶	۲۸	۷۰/۴	هیپووترمی خفیف
۰/۰۰۰	۲۲	۲/۰	۳	۰/۶	۷	۲/۹	۴	۳/۸	۸	۱۴/۸	هیپووترمی شدید
۰/۰۰۰	۴۷۸	۵۳/۳	۲۲۴	۴۰/۴	۱۳۴	۵۶/۹	۷۴	۶۹/۸	۴۶	۸۵/۲	جمع شیوع هیپووترمی
۰/۰۰۰	۴۲۰	۴۶/۷	۲۷۰	۵۴/۶	۱۱۰	۴۵/۱	۳۲	۳۰/۲	۸	۱۴/۸	درجہ حرارت طبیعی
۰/۰۰۰	۸۹۸	۱۰۰	۴۹۴	۱۰۰	۲۴۴	۱۰۰	۱۰۶	۱۰۰	۵۴	۱۰۰	جمع کل

جدول شماره ۴ - متوسط درجه حرارت نوزادان هیپوترم بر حسب ساعت پس از تولد نوزادان بستری شده در بخش

مراقبت‌های ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) سال ۱۳۸۰

sd	درجه حرارت	تعداد	متوسط درجه حرارت
±۰/۳	بدو ورود	۴۷۸	۳۵/۸۷
±۰/۳	ساعت اول	۱۱۸	۳۵/۵۹
±۰/۲	ساعت دوم	۲۸	۳۴/۷۶
±۰/۲	ساعت سوم	۵	۳۵/۹۴
±۰/۲	ساعت چهارم	۲	۳۶/۲۵
±۰/۲	ساعت پنجم	۱	۳۶/۴۹

* درجه حرارت به سانتی‌گراد

جدول شماره ۵ - نسبت خطر مرگ در نوزاد هیپوترم و غیر هیپوترم در بین نوزادان بستری شده در بخش مراقبت‌های

ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) سال ۱۳۸۰

odds ratio and ٪۹۵ CI	p value	کل	متوسط تا شدید		درجه حرارت*	وضعیت حیات (%)
			≥۳۶/۵	<۳۶/۵		
۳/۶۴۶ ۱/۸۵۲-۷/۱۸۲	.۰۰۰	۵۳ (٪۶)	۱۱ (٪۲/۷)	۴۲ (٪۹)	مرده	
		۸۲۷ (٪۹۴)	۴۰۴ (٪۹۷/۳)	۴۲۳ (٪۹۱)	زنده	
		۸۸۰ (٪۱۰۰)	۴۱۵ (٪۱۰۰)	۴۶۵ (٪۱۰۰)	کل	

* درجه حرارت به سانتی‌گراد

جدول شماره ۶ - نسبت خطر مرگ در نوزادان با هیپوترمی خفیف - متوسط تا شدید و بدون هیپوترمی نوزادان بستری

شده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) سال ۱۳۸۰

کل	>۳۶/۵	۳۵-۳۶/۴	<۳۵	متوسط تا شدید		درجه حرارت*	وضعیت حیات (%)
				نورموترم	خفیف		
۵۳ (٪۶)	۱۱ (٪۲/۷)	۲۴ (٪۷/۶)	۸ (٪۴۲/۱)			مرده	
۸۲۷ (٪۹۴)	۴۰۴ (٪۹۷/۳)	۴۱۲ (٪۹۲/۴)	۱۱ (٪۵۷/۹)			زنده	
۸۸۰ (٪۱۰۰)	۴۱۵ (٪۱۰۰)	۴۴۶ (٪۱۰۰)	۱۹ (٪۱۰۰)			کل	
		۲/۰۲	۲۶/۷			شاش خطر نسبت به نوزادان نورموترم	

* درجه حرارت به سانتی‌گراد

بعد از تولد رنج می‌برند که دلیل احتمالی آن ممکن است فقدان دانش کارکنان اتاق زایمان از عوارض و خیم هیپوترمی و عدم پوشاندن کافی نوزاد و عدم آگاهی از روش‌های جلوگیری از هیپوترمی است و همچنین عدم آموزش کارکنان در این زمینه می‌باشد. مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته نشان داده است که شیوع هیپوترمی در نوزادان نارس با وزن کم و یا نوزادان در حین انتقال محدود می‌شود در

بحث و نتیجه‌گیری

به دلیل عواقب ناگوار هیپوترمی در نوزادان، مراقبت‌های حرارتی یکی از پایه‌های اساسی مراقبت‌های پرستاری نوزادان است. عوارض شدید هیپوترمی که تا به حال گزارش شده‌اند عبارت است از: افزایش میزان مرگ و میر در نوزادان کم وزن، خونریزی ریه، اسیدوز متابولیک و هیپوگلیسمی. این مطالعه نشان داد بیش از نیمی از نوزادان از هیپوترمی

راهکارهای جلوگیری از هیپوترم شدن نوزاد رسیده و نارس می‌باشد. هیپوترمی هنوز یک مشکل حل نشده در کشورهای در حال توسعه با وجود آب و هوای متنوع می‌باشد که پیشگیری از آن احتیاج به تکنولوژی پیچیده و پیشرفته‌ای ندارد، با آموزش کافی به کارکنان پرستاری و مامایی می‌توان از وقوع آن در اتاق زایمان و یا در حین انتقال نوزاد از مرکزی به مرکز دیگر پیشگیری کرد البته لازم است اقدامات پیشگیری کننده برای نوزادان با وزن کم و سن حاملگی پایین‌تر تشديد یابد.

تشکر و قدردانی

این طرح با حمایت مرکز تحقیقات بهداشت ناباروری بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی تهران و با کمک خانم دکتر فاطمه نیری انجام گرفته است. در پایان از کلیه پرستاران اتاق عمل و اتاق زایمان و بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان که مساعدت‌های لازم را جهت انجام این پژوهش فراهم آورده‌ند تشکر و سپاسگزاری می‌نماییم.

حالی که در کشورهای در حال توسعه این مشکل گریبانگیر همه نوزادان می‌باشد. این مطالعه که در طول سال با درجه حرارت متفاوت محیط خارج از بخش از ۴۰-۰ درجه سانتی‌گراد انجام گرفت نشان داد شیوع هیپوترمی حد واسطه بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است (جدول شماره ۱).

دلیل احتمالی بالا بودن میزان هیپوترمی در این مطالعه در مقایسه با زامبیا و هند این است که بخش نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج) یک مرکز مراقبتی گستردۀ (دارای ۳ بخش مراقبت از نوزادان به طریقه هم‌اتاقی مادر و نوزاد^۱، مراقبت از نوزادان بیمار و مراقبت ویژه از نوزادان بسیار بد حال) می‌باشد و هم‌چنین تعداد بسیار زیاد زایمان‌های پرخطر و نارس که به بیمارستان ولیعصر ارجاع می‌شود. در این مطالعه شدت هیپوترمی نیز علاوه بر شیوع هیپوترمی مورد بررسی قرار گرفت در حالی که در مطالعات سایرین فقط بر روی شیوع آن تأکید کرده‌اند و شدت هیپوترمی نیز در این مطالعه به طرز معناداری با وزن تولد و سن حاملگی رابطه آماری داشت. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان داد که مراقبت‌های پرستاری جهت پیشگیری از هیپوترمی در نوزادان با وزن کم و با سن حاملگی پایین‌تر باید با دقیت بیشتری انجام شود. به نظر پژوهشگران پرستاران باید به آمادگی‌های قبل از زایمان توجه داشته باشند مثل: گرم کردن اطاق زایمان، فراهم بودن شان و ملافه‌های گرم، روشن بودن رادیانت وارمر و قرار دادن نوزاد در محیط گرم و دور کردن ملافه و شان خیس از نوزاد و پوشاندن لباس گرم و کلاه و جوراب و استفاده از ملافه و پتوی گرم که از بهترین

منابع

- 1 - WHO/ FHE/ SM. Thermal control of the newborn: a practical guide. Geneva; 1993. P. 1-4.
- 2 - Fanaroff AA, Martin RJ. Neonatal – prenatal medicine, volume 1. St. Louis: Mosby Co; 2001. P. 515.
- 3 - Loughead MK, Loughead JL, Reinhart MJ. Incidence and physiologic characteristics of hypothermia in the very low birth weight infant. *Pediatr Nurs.* 1997 Jan-Feb; 23(1): 11-5.
- 4 - Hazan J, Maag U, Chesseix P. Association between hypothermia and mortality rate of premature infants--revisited. *Am J Obstet Gynecol.* 1991 Jan; 164(1 Pt 1): 111-2.
- 5 - Takayama JI, Teng W, Uyemoto J, et al. Body temperature of newborns: what is normal? *Clin Pediatr (Phila).* 2000 Sep; 39(9): 503-10.
- 6 - Bowman ED, Roy RN. Control of temperature during newborn transport: an old problem with new difficulties. *J Paediatr Child Health.* 1997 Oct; 33(5): 398-401.
- 7 - Christensson K, Bhat GJ, Eriksson B, et al. The effect of routine hospital care on the health of hypothermic newborn infants in Zambia. *J Trop Pediatr.* 1995 Aug; 41(4): 210-4.
- 8 - Johanson RB, Malla DS, Tuladhar C, et al. A survey of technology and temperature control on a neonatal unit in Kathmandu, Nepal. *J Trop Pediatr.* 1993 Feb; 39(1): 4-10.
- 9 - Kumar R, Aggarwal AK. Body temperature of home delivered newborns in north India. *Journal of Tropical Doctor.* 1998; 28(3): 134-136.
- 10 - da Mota Silveria SM, Goncalves de Mello MJ, de Arruda Vidal S, et al. Hypothermia on admission: a risk factor for death in newborns referred to the Pernambuco Institute of Mother and Child Health. *J Trop Pediatr.* 2003 Apr; 49(2): 115-20.
- 11 - Vohra S, Frent G, Campbell V, et al. Effect of polyethylene occlusive skin wrapping on heat loss in very low birth weight infants at delivery: a randomized trial. *J Pediatr.* 1999 May; 134(5): 547-51.
- 12 - Kliegman RM. Fetal and neonatal medicine. In: Behman RE, Kliegman RM, editors. Nelsons essentials of pediatrics. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders; 2002. P. 203.